Cathéters veineux périphériques: indications

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié**.** La forme et le contenu de ce document doivent faire l'objet d'amélioration continue dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Couleur						
	Orange	Gris	Vert	Rose	Bleu	Jaune
Gauge	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Indications	- Patients polytraumatisés - En cas des transfusions sanguines, des perfusions de liquide visqueux ou de remplissage rapide - Plusieurs lignes de perfusion	- Administration de gros volume de liquides ou patients polytraumatisés - Opérations chirurgicales majeures - Lors de l'accouchement ou en post-partum - Hémorragie massive - Transfusions multiples - Plusieurs lignes de perfusion	- Administration de gros volume de liquides (≥ 3 litres/ jour) - Produits sanguins labiles - Fluides visqueux - Injection de médicaments irritants ou visqueux - Plusieurs lignes de perfusion - Opérations chirurgicales majeures - Imagerie qui demande l'injection de produit de contraste	- Utilisation fréquent (volume de 2 à 3 litres/jour) - Entretien - Antibiotiques - Antalgie	- Veines de petit calibre ou fragiles - La plupart des traitements pharmacologiques - Injection intermittente ou administration de soluté(s) en bolus - Traitement cytotoxique	- Veines de petit calibre - Vitesse d'injection lente - Traitements liés au cancer

NB : Images données à titre indicatif. Le matériel est susceptible de changer.